


# Stroke at ER PMK

ร.อ.หญิง อัมภารรณ ศรีหิรัญ

พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

# โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)



# Stroke Fast Track

ผู้ป่วยที่มีอาการ BEFAST  
ภายใน 6 ชั่วโมง  
(ภายใน 12 ชั่วโมง ในผู้ป่วย  
suspected posterior  
circulation stroke)

- B**  **BALANCE:** Watch for a sudden loss of balance.
- E**  **EYES:** Is there a sudden loss of vision in one or both eyes? Or double vision?
- F**  **FACE:** Ask the person to smile. Does one side of the face droop?
- A**  **ARMS:** Ask the person to raise both arms. Does one arm drift downward?
- S**  **SPEECH:** Ask the person to repeat a simple phrase. Is their speech slurred or strange?
- T**  **TIME:** If you observe any of these signs, call 9-1-1 immediately.

# B E F A S T

**Balance** เวียนศีรษะ เดินเซ

**Eye** ตาพร่ามัว

**Face** หน้าเบี้ยว หนังตาตก มุมปากตก

**Arm** แขนขา ชา อ่อนแรง

**Speech** พูดไม่ชัด พูดลำบาก ไม่พูด

**Time** ภายใน 6 ชั่วโมง

(ภายใน 12 ชั่วโมง ในผู้ป่วย suspected posterior circulation stroke)


**ESI** (Emergency Severity Index)

อยู่ระดับ 1 หรือ 2

**ต้องพบแพทย์ทันที!!!**

# KPI หลังได้รับการคัดแยก ควร

## Door To Needle




# การให้ยา Actilyse



**Total dose =  $0.9 \times \text{kg}$**



**Maximum dose 90 mg**

**10% slow push over 1 minutes**

**90% drip over 60 minutes**









**A**

ประเมินทางเดิน  
หายใจ ดูค塞姆หะ  
เปิดทางเดินหายใจ

**B**

ประเมินการหายใจ  
ให้ O<sub>2</sub> support  
ถ้า O<sub>2</sub> sat ≤ 94%

**C**

ความดันโลหิต ไม่ต่ำกว่า 90/60 mmHg  
ก่อนให้ยา Actilyse ไม่ควรเกิน

**185/110 mmHg**

หลังให้ยา Actilyse ไม่ควรมากกว่า

**180/105 mmHg**

บันทึกและรายงานแพทย์ทันที

**D**

หลังให้ยา Actilyse ประเมิน V/S และ  
อาการทางระบบประสาท **ทุก 15 นาที**

ถ้า GCS เปลี่ยน  $\geq 2$  หรือ

NIHSS เปลี่ยน  $\geq 4$

ความรู้สึกตัวเปลี่ยน มี N/V

หยุดให้ยาทันทีและรายงานแพทย์

Thank  
you

